


Indikationen für die Hämoadsorption mit CytoSorb® Adsorbern

Intensivmedizinischer Einsatz



Bitte jeden Adsorber einzeln kodieren und abrechnen

- Erhöhter Zytokinspiegel
(gemessen oder aufgrund des klinischen Bildes)
 - bei vasoplegischem Schock
 - bei ARDS
 - bei Verbrennung/Trauma
 - bei akuter Pankreatitis
 - bei ECMO
 - HLH, MAS, CRS *
 - Sonstiges: _____

↳ In der Zusammenschau:
Erhöhtes Risiko für hyperinflammations-
bedingte Komplikationen

- Erhöhter Bilirubinspiegel
 - bei akuter Leberdysfunktion
 - bei akutem-auf-chronischem Leberversagen (ACLF)
- Erhöhter Myoglobinspiegel
 - bei schwerer Rhabdomyolyse
- Entfernung sonstiger hydrophober Substanzen
(niedrig-, mittelmolekular)

Indikation

festgestellt am _____

Unterschrift _____

* HLH: hämophagozytische Lymphohistiozytose, MAS: Makrophagenaktivierungssyndrom, CRS: Zytokin-Freisetzungssyndrom

	Beginn CytoSorb Adsorber Datum: _____ Uhrzeit: _____	Ende CytoSorb Adsorber Datum: _____ Uhrzeit: _____
	Beginn CytoSorb Adsorber Datum: _____ Uhrzeit: _____	Ende CytoSorb Adsorber Datum: _____ Uhrzeit: _____
	Beginn CytoSorb Adsorber Datum: _____ Uhrzeit: _____	Ende CytoSorb Adsorber Datum: _____ Uhrzeit: _____
	Beginn CytoSorb Adsorber Datum: _____ Uhrzeit: _____	Ende CytoSorb Adsorber Datum: _____ Uhrzeit: _____
	Beginn CytoSorb Adsorber Datum: _____ Uhrzeit: _____	Ende CytoSorb Adsorber Datum: _____ Uhrzeit: _____

Therapie

Kontakt

Um weitere Informationen zur Abrechnung, Kodierung sowie ausführliche Unterlagen zur Kalkulation zu erhalten, besuchen Sie www.cyto.news/kostenerstattung oder kontaktieren Sie uns unter reimbursement@cytosorbents.com