

CytoSorb-Therapie

Herzchirurgischer Einsatz



- Operative Versorgung einer Endokarditis
 - Operative Versorgung einer Aortendissektion
 - VAD / Kunstherzimplantation / Herztransplantation
 - ECMO / ECLS
 - Sonstige: _____
- **In Zusammenschau mit dem gesamten klinischen Bild:**
Erhöhtes Risiko für hyperinflammationsbedingte, intra- wie postoperative Komplikationen.
- Entfernung von Ticagrelor oder Rivaroxaban bei erhöhtem perioperativem Blutungsrisiko

Indikation Intraoperativ

festgestellt am _____ Unterschrift _____



Beginn CytoSorb-Therapie	Ende CytoSorb-Therapie
Datum: _____	Datum: _____
Uhrzeit: _____	Uhrzeit: _____

Therapie

Postoperative Fortführung empfohlen : Ja Nein

- Septischer Schock
- Vasoplegischer Schock
- Kardiogener Schock
- COVID-19
- Verbrennung / Trauma
- Pankreatitis
- ECMO / ECLS
- Postoperative Fortführung

➤ **In der Zusammenschau:** Indikation mit ausgeprägter Vasoplegie mit hohem Vasopressorbedarf, erhöhten Laktatwerten und unzureichendem Ansprechen auf Standardtherapie.


- Myoglobinentfernung bei Rhabdomyolyse
- Bilirubinentfernung bei Leberdysfunktion
- Akutes-auf-chronisches Leberversagen (ACLF)
- Sonstige: _____

Indikation Postoperativ

festgestellt am _____ Unterschrift _____



Beginn CytoSorb-Therapie	Ende CytoSorb-Therapie
Datum: _____	Datum: _____
Uhrzeit: _____	Uhrzeit: _____



Beginn CytoSorb-Therapie	Ende CytoSorb-Therapie
Datum: _____	Datum: _____
Uhrzeit: _____	Uhrzeit: _____

Therapie